




Emilia Romagna

Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



| Regione Emilia Romagna | anno 2006 | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | anno 2010 | 2006-2010 | Inflazione 2006-2010 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| Numero ricette | 35.505.802 | 37.169.023 | 38.801.884 | 40.490.031 | 42.115.454 | +24.1% | 7,7% |
| Spesa lorda | 836.430.200 | 817.532.282 | 799.221.098 | 814.854.915 | 823.444.926 | -2.4% | |
| Spesa netta | 793.431.532 | 769.734.197 | 745.124.394 | 749.587.706 | 745.386.566 | -4.3% | |

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Emilia Romagna: confronto 2010/2009

| Gruppo ATC | incidenza su spesa 2010 | diff. rispetto spesa 2009 | incidenza sul n. confezioni 2010 | diff. rispetto confezioni 2009 |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| sistema cardiovascolare | 40,82% | -1,67% | 39,16% | +3,32% |
| apparato gastrointestinale e metabolismo | 15,28% | +6,74% | 18,51% | +10,13% |
| sistema nervoso | 11,61% | +8,18% | 8,76% | +6,20% |
| sistema respiratorio | 8,66% | +2,51% | 4,01% | +0,53% |
| antimicrobici generali per uso sistemico | 7,17% | -8,22% | 7,37% | -2,85% |
| sistema muscolo-scheletrico | 4,36% | +5,50% | 4,17% | +1,38% |
| sistema genito-urinario ed ormoni sessuali | 3,82% | +3,23% | 3,85% | +4,10% |
| sangue ed organi emopoietici | 3,15% | +3,51% | 7,94% | +2,60% |
| organi di senso | 2,28% | +10,99% | 1,87% | +8,10% |
| preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline | 1,22% | +7,50% | 3,46% | +5,62% |

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Emilia Romagna

| Principio attivo | incidenza su spesa 2010 | diff. rispetto spesa 2009 |
|---|-------------------------|---------------------------|
| atorvastatina calcio triidrato | 4,69% | +7,22% |
| lansoprazolo | 2,92% | +3,53% |
| rosuvastatina sale di calcio | 2,83% | +13,51% |
| esomeprazolo magnesio triidrato | 2,64% | +6,42% |
| salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato | 2,35% | +2,90% |
| valsartan/idroclorotiazide | 1,90% | +4,91% |
| simvastatina | 1,55% | +6,30% |
| omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi) | 1,55% | +11,50% |
| valsartan | 1,48% | +10,56% |
| irbesartan/idroclorotiazide | 1,48% | +0,61% |

I 10 principi attivi più prescritti in Emilia Romagna

| Principio attivo | incidenza sul n. confezioni 2010 | diff. rispetto confezioni 2009 |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| lansoprazolo | 4,35% | +6,75% |
| acido acetilsalicilico | 3,47% | +6,80% |
| ramipril | 3,47% | +10,33% |
| amlodipina besilato | 2,03% | +7,85% |
| furosemide | 1,96% | +6,60% |
| metformina cloridrato | 1,90% | +14,90% |
| levotiroxina sodica | 1,87% | +6,70% |
| pantoprazolo sodico sesquidrato | 1,76% | +22,36% |
| omeprazolo | 1,73% | +20,87% |
| simvastatina | 1,60% | +12,93% |