




Emilia Romagna

Spesa e numero ricette: variazione rispetto all'anno precedente



| Regione Emilia Romagna | anno 2009 | anno 2010 | anno 2011 | anno 2012 | anno 2013 | 2009-2013 | Inflazione 2009-2013 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| Numero ricette | 40.490.031 | 42.115.454 | 42.598.587 | 41.990.453 | 42.543.344 | +5.1% | 8,7% |
| Spesa lorda | 814.854.915 | 823.444.926 | 784.771.329 | 703.262.245 | 669.392.147 | -17.9% | |
| Spesa netta | 749.587.706 | 745.386.566 | 678.221.850 | 590.288.929 | 560.567.262 | -25.2% | |

I gruppi ATC di 1° livello a maggiore spesa in Emilia Romagna: confronto 2013/2012

| Gruppo ATC | incidenza su spesa 2013 | diff. rispetto spesa 2012 | incidenza sul n. confezioni 2013 | diff. rispetto confezioni 2012 |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| sistema cardiovascolare | 35,62% | -8,87% | 38,68% | +0,09% |
| apparato gastrointestinale e metabolismo | 16,47% | -0,72% | 20,29% | +3,50% |
| sistema nervoso | 13,32% | -5,42% | 8,84% | +0,73% |
| sistema respiratorio | 9,76% | -2,98% | 3,73% | +2,26% |
| antimicrobici generali per uso sistemico | 6,92% | +3,28% | 6,87% | +5,45% |
| sistema genito-urinario ed ormoni sessuali | 4,43% | -0,01% | 3,81% | +0,66% |
| sistema muscolo-scheletrico | 3,78% | -10,86% | 3,54% | -3,94% |
| sangue ed organi emopoietici | 3,56% | -5,93% | 7,91% | -0,37% |
| organi di senso | 2,78% | +0,42% | 1,85% | -0,24% |
| preparati ormonali sistemici, escl. ormoni sessuali e insuline | 1,67% | +4,26% | 3,63% | +4,98% |

I 10 principi attivi a maggior spesa SSN in Emilia Romagna

| Principio attivo | incidenza su spesa 2013 | diff. rispetto spesa 2012 |
|---|-------------------------|---------------------------|
| lansoprazolo | 3,05% | -7,01% |
| salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato | 2,60% | -0,30% |
| rosuvastatina sale di calcio | 2,44% | -18,22% |
| pantoprazolo sodico sesquidrato | 2,23% | +11,48% |
| ramipril | 1,85% | +4,85% |
| simvastatina | 1,49% | -1,08% |
| tiotropio bromuro | 1,39% | -3,81% |
| omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi) | 1,37% | -30,70% |
| atorvastatina calcio triidrato | 1,32% | -43,95% |
| escitalopram ossalato | 1,22% | -13,66% |

I 10 principi attivi più prescritti in Emilia Romagna

| Principio attivo | incidenza sul n. confezioni 2013 | diff. rispetto confezioni 2012 |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| ramipril | 4,07% | +7,54% |
| lansoprazolo | 3,92% | -5,62% |
| acido acetilsalicilico | 3,63% | +1,63% |
| pantoprazolo sodico sesquidrato | 2,94% | +13,00% |
| metformina cloridrato | 2,31% | +6,51% |
| amlodipina besilato | 2,17% | +2,57% |
| furosemide | 2,08% | +3,03% |
| levotiroxina sodica | 2,04% | +4,46% |
| simvastatina | 1,94% | +1,39% |
| omeprazolo | 1,68% | -3,16% |